

Überleitungsbogen **MultiResistente Erreger**

Patientendaten:

Name _____
 Vorname _____
 Geburtsdatum _____
 Adresse _____

Einrichtung/Stempel:

Telefonnummer: _____
 für Rückfragen

Nachweis eines Krankheitserregers mit speziellen Resistenzen und Multiresistenzen nach § 23 Abs. 8 Satz 10 IfSG und § 13 Abs. 1 und 2 ThürmedHygVO

- MRSA *¹
- VRE (Vancomycinresistente Enterokokken)
- Nachweis einer ESBL
- Nachweis einer Carbapenemase
- multiresistente gramnegative Erreger (3 MRGN)*²** _____
- multiresistente gramnegative Erreger (4 MRGN) *²** _____
- sonstiger Nachweis eines multiresistenten Erregers _____

Lokalisation: Nase, Rachen Sputum/Trachealsekret
 Wunde Urin
 Stuhl Haut Lokalisation: _____
 (Leiste, Achsel)
 Blutkultur

Trägerstatus: Kolonisation Infektion

Letzter Nachweis: _____
 (Datum)

Unterschrift: _____

Die Durchführung der hygienischen Händedesinfektion ist eine der effektivsten Methoden zur Prävention nosokomialer Infektionen!

1 **Bitte ausgefüllten Sanierungsbogen beifügen.**
 2 **Bitte umseitige Erläuterungen beachten.**



1. **MRSA** - Mitteilung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention am Robert Koch-Institut:

- **Empfehlungen zur Prävention und Kontrolle von Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus-Stämmen (MRSA) in Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen**

2. **VRE** - RKI Empfehlung:

- **Konsensusempfehlung Baden-Württemberg: Umgang mit Patienten mit Glykopeptid-resistenten Enterokokken (GRE)/Vancomycinresistenten Enterokokken (VRE)**

3. **MRGN** - Erläuterungen zu 3 MRGN *² und 4 MRGN *² Quelle:RKI Epidemiologisches Bulletin 36/2011:

Antibiotikagruppe	Leitsubstanz	<i>Enterobacteriaceae</i>		<i>Pseudomonas aeruginosa</i>		<i>Acinetobacter spp.</i>	
		3MRGN ¹	4MRGN ²	3MRGN ¹	4MRGN ²	3MRGN ¹	4MRGN ²
Acylureidopenicilline	Piperacillin/ Tazobactam	R	R	Nur eine der vier Antibiotika- gruppen wirksam (sensibel)	R	R	R
Cephalosporine der 3./4. Generation	Cefotaxim und/ oder Ceftazidim	R	R		R	R	R
Carbapeneme	Imipenem und/ oder Meropenem	S	R		R	S	R
Fluorchinolone	Ciprofloxacin	R	R		R	R	R

Tab. 1: Klassifizierung multiresistenter gramnegativer Stäbchen auf Basis ihrer phänotypischen Resistenzeigenschaften

(R = resistent oder intermediär sensibel, S = sensibel)

¹ 3MRGN (Multiresistente gramnegative Stäbchen mit Resistenz gegen 3 der 4 Antibiotikagruppen)

² 4MRGN (Multiresistente gramnegative Stäbchen mit Resistenz gegen 4 der 4 Antibiotikagruppen)

4. **MRGN** - Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention am Robert Koch-Institut:

- **Hygienemaßnahmen bei Infektion oder Besiedlung mit multiresistenten gramnegativen Stäbchen**
- **Ergänzung zu den "Hygienemaßnahmen bei Infektionen oder Besiedlung mit multiresistenten gramnegativen Stäbchen" (2012) im Rahmen der Anpassung an die epidemiologische Situation**

5. **MRGN** - Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene e. V.:

- **Maßnahmenplan für multiresistente gramnegative Erreger (MRGN) in Gesundheits-/Pflege- und Betreuungseinrichtungen**